

Taulukko 1. Kasvirohdosvalmisteet, joille myönnettiin lääkevalmisteen myyntilupa vuosina 2017–2018.

	Dropizol 10 mg/ml tipat, liuos	Sefitude tabletti päällystetty	Lunixen tabletti, kalvopäällysteinen
Vaikuttava aine	Oopimintinktuura vastaten morfiinia 10 mg/ml	Rohtovirmajuurikuivauutetta 445 mg/tabla. Valmistukseen käytetty rohtovirmajuurta noin 1,3–2,7 g/tabla.	Rohtovirmajuurikuivauutetta 500 mg/tabla. Valmistukseen käytetty rohtovirmajuurta 2–3 g/tabla..
Valmistukseen käytetty lähtörohdos	Papaver somniferum L., hartsia	Valeriana officinalis L., juuri	Valeriana officinalis L., juuri
Uuttoliuotin	etanoli 33 % V/V	etanoli 70 % V/V	etanoli 60 % V/V
Käyttötarkoitus	Vaikean ripulin hoitoon silloin, kun muut ripulihoidot eivät ole tehonneet riittävästi. Tällaista vaikeaa ripulia voivat aiheuttaa esimerkiksi solusalpaajalääkitys, sädehoito ja neuroendokriiniset kasvaimet.	Kasvirohdosvalmiste lievän hermostuneisuuden ja unihäiriöiden lievittämiseen.	Kasvirohdosvalmiste lievän hermostuneisuuden ja unihäiriöiden helpottamiseen.
Pediatriiset potilaat	Ei saa käyttää alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille turvallisuussyistä.	Ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille, koska ei ole tietoa valmisteen turvallisuudesta ja tehosta lapsilla.	Ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille, koska ei ole tietoa valmisteen turvallisuudesta ja tehosta lapsilla.
lääkkää potilaat	Hoidossa noudatettava varovaisuutta ja annostusta pienennettävä jo hoitoa aloitettaessa.	Ei erityistä.	Ei erityistä.
Muuta käytössä huomioitavaa	Erityisvaroitukset valmisteyhteenvedotekstissä, samoin tiedot mahdollisista haitta- ja yhteisvaikutuksista.		
Erytystä	Hoidon aloittavan ja sitä valvovan on oltava erikoislääkäri.	Jos oireet pahenevat valmisteen käytön aikana, on käännettävä lääkärin puoleen.	Jos oireet pahenevat valmisteen käytön aikana, on käännettävä lääkärin puoleen.
Toimitusehto	Reseptilääke. Vain huumausainereseptillä.	Itsehoitolääke, vain apteekista.	Itsehoitolääke, vain apteekista.