

Taulukko 2. Perinteiset kasvirohdosvalmisteet, joille myönnettiin lääkevalmisteen rekisteröinti vuosina 2017–2018.

	Harpatinum kapseli, pehmeä	Lyngonia tabletti, kalvopäällysteinen	Rowiren emulsiovoide	Glitinum kapseli, kova
Vaikuttava aine	Pirunkouran juuresta valmistettua kuivauutetta 225 mg/kaps. Valmistukseen käytetty pirunkouran juurta noin 1–1,1 g/kaps.	Sianpuolukan lehdestä valmistettua kuivauutetta 361–509 mg/tabl. vastaten 105 mg hydrokinonijohdan naisia arbutiiniksi laskettuna. Valmistukseen on käytetty sianpuolukan lehtiä noin 0–2,3 g/tabl..	Rosmariiniöljyä 100 mg/g	Jauhettua reunuspäivänkakkaran versoa 100 mg/kaps.
Valmistukseen käytetty lähtörohdos	Harpagophytum procumbens DC tai Harpagophytum zeyheri Decne. juuri	Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. lehti	Rosmarinus officinalis L.	Tanacetum parthenium (L.) Schulz Bip. verso
Uuttoliuotin	etanoli 60 % V/V	vesi	-	-
Käyttötarkoitukset	Perinteinen kasvirohdosvalmiste lievien nivelkipujen lievittämiseen, lievien ruoansulatuskanavan häiriöiden, kuten turvotuksen ja ilmavaivojen, sekä väliaikaisen ruokahaluttomuuden lievittämiseen.	Perinteinen kasvirohdosvalmiste, jota käytetään lievittämään naisten lievien toistuvien alempien virtsateiden tulehdusten oireita, kuten virtsaamisen aikaista polttavaa tunnetta ja/tai tiheää virtsaamista, kun lääkäri on sulkenut pois vakavat sairaudet.	Perinteinen kasvirohdosvalmiste. Perinteisen kasvirohdosvalmisteen rekisteröinti on hyväksytty ehdollisena, koska kansalliset tekstit puuttuvat. Valmisteen voi tuoda kauppaan vasta, kun kansalliset tekstit on hyväksytty.	Perinteinen kasvirohdosvalmiste migreenipäänsärlyn ehkäisyyn, kun lääkäri on sulkenut pois vakavat sairauksat.
Pediatriiset potilaat	Ei suositella lapsille ja alle 18-vuotiaille, koska tietoa ei ole riittävästi.	Ei suositella lapsille ja alle 18-vuotiaille, koska lääkärin ohjeistus on lasten virtsatieoireissa tarpeen.		Glitinumin käyttö on vasta-aiheista lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille. Riittäviä tietoja ei ole saatavilla.
Muut ryhmät		Ei suositella miehille, koska		

		lääkärin ohjeistus on miesten virtsatieoireissa tarpeen.		
Muuta käytössä huomioitavaa	Erityisvaroitukset valmisteyhteenvetotekstissä, samoin tiedot mahdollisista haitta- ja yhteisvaikutuksista.			
Erityistä	<p>Sisältää soijaöljyä ja soijan fosfolipidejä.</p> <p>Lääkärin on tutkittava nivelkivut, joihin liittyy nivelten turvotusta, punoitusta tai kuumetta.</p> <p>Jos on sappikiviä, ennen valmisteen käyttöä on neuvoteltava lääkärin kanssa.</p> <p>Jos oireet pahenevat valmisteen käytön aikana, on käännyttävä lääkärin puoleen.</p>	<p>Jos oireet jatkuvat yli 4 päivää tai pahenevat lääkevalmisteen käytön aikana, on otettava yhteyttä lääkäriin.</p> <p>Valmistetta ei tule käyttää 1 viikkoa pidempään.</p>		<p>Jos oireet jatkuvat yli 2 kuukautta lääkevalmisteen käytön aikana, on otettava yhteyttä lääkäriin.</p> <p>Valmistetta ei tule käyttää 3 kuukautta pidempään.</p>
Toimitusehto	Itsehoitolääke. Saa myydä myös apteekkien ulkopuolella.	Itsehoitolääke. Saa myydä myös apteekkien ulkopuolella.	Itsehoitolääke. Saa myydä myös apteekkien ulkopuolella.	Itsehoitolääke, vain apteekista.