

Taulukko 1. Vuonna 2018 ilmoituksissa 10 useimmiten esiintynyttä lääkeainetta ja niiden yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset.

Lääkeaine (<i>kauppanimiä</i>)	Ilmoitusten lkm 2018	Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset
Klotsapiini (<i>mm. Leponex; Froidir</i>)	158	Valkosoluihin kohdistuvat haitat
Levonorgestreeli (<i>Mirena, Jaydess, Kyleena</i>)	132	Kohdunulkoiset raskaudet, raskaudet, (tiputtelu)vuodot
Rivaroksabaani (<i>Xarelto</i>)	122	Verenvuodot, tromboemboliset tapahtumat, ruuansulatuskanavan oireet
Adalimumabi (<i>mm. Humira</i>)	94	Pistoskohdan reaktiot, infektio-oireet (yleisimmin ylähengitystiet-infektiot)
Aspartinsuliini (<i>mm. Fiasp, Novorapid, Novomix</i>)	93	Lääkkeen tehoon liittyvät ilmoitukset, verensokerin nousut ja vaihtelut
Apiksabaani (<i>Eliquis</i>)	91	Verenvuodot, ruuansulatuskanavan oireet, iho-oireet
Dimetyylifumaraatti (<i>Tecfidera</i>)	90	ruuansulatuskanavan oireet, iho-oireet
Empagliflotsiini (<i>Jardiance</i>)	86	Genitaali- ja virtsatieinfektiot , ketoasidoosi
Glargininsuliini (<i>mm. Abasaglar, Lantus, Suliqua, Toujeo</i>)	72	Verensokerin nousut ja vaihtelut, lääkkeen tehoon liittyvät ilmoitukset
Alemtutsumabi (<i>Lemtrada</i>)	66	Urticaria, infektiot, päänsärky, kuume