

Tabell 2. Exempel på rekommendationstexter för diabetesläkemedel i databasen Medicin75+.

| Läkemedel | Klass | Rekommendationstext |
|---------------|-------|--|
| Linagliptin | A | Läkemedlet är lämpligt för åldringar. Dosen behöver inte ändras vid njursvikt. |
| Eksenatid | C | Lämpar sig med förbehåll för åldringar. Föga erfarenhet av bruk av långtidsverkande preparat. Minska dosen vid medelsvår njursvikt. Använd inte vid svår njursvikt. Vikten kan gå ner. |
| Empagliflozin | C | Lämpar sig med förbehåll för åldringar. Minska dosen redan vid medelsvår njursvikt. Använd inte vid svår njursvikt. Observera risken för uttorkning och urinvägsinfektion. |
| Metformin | C | Lämpar sig med förbehåll för åldringar. Minska dosen redan vid lindrig njursvikt. Använd inte vid svår njursvikt eller vävnadshypoxi. Kan försvaga absorptionen av vitamin B12. Observera risken för mjölksyraacidosis. Håll paus i samband med feber, gastroenterit eller dehydrering samt före operation eller kontrastmedelsundersökning. |
| Dapagliflozin | D | Undvik bruk på åldringar. Rekommenderas inte för personer som fyllt 75 år. Använd inte vid medelsvår eller svår njursvikt. Observera risken för uttorkning och urinvägsinfektion. |
| Glimepirid | D | Undvik bruk på åldringar. Långtidsverkande sulfonylurea. Risken för biverkningar ökar när njur- och leverfunktionen försvagas. Använd inte vid svår njursvikt. Beakta interaktionerna. Läkemedlet är förknippat med en risk för utdragen hypoglykemi. |