

Taulukko 2. Esimerkkejä diabeteslääkkeiden suositusteksteistä Lääke75+-tietokannassa.

Lääkeaine	Luokka	Suosituksiteksti
Linagliptiini	A	Sopii iäkkäille. Annosta ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoiminnassa.
Eksenatidi	C	Soveltuu varauksin iäkkäillä. Käyttökokemus pitkävaikutteisesta valmisteesta vähäistä. Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Paino voi laskea.
Empagliflotsiini	C	Soveltuu varauksin iäkkäille. Pienennä annosta jo keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi kuivumisen ja virtsatietulehduksen riski.
Metformiini	C	Soveltuu varauksin iäkkäille. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Voi heikentää B12-vitamiinin imeytymistä. Huomioi maitohapposidoosin riski. Tauota kuumeen, gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä ennen leikkausta tai varjoainokuvausta.
Dapagliflotsiini	D	Vältä käyttöä iäkkäillä. Ei suositella 75 vuotta täyttäneille. Älä käytä keskivaikeassa tai vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi kuivumisen ja virtsatietulehduksen riski.
Glimepiridi	D	Vältä käyttöä iäkkäillä. Pitkävaikutteinen sulfonyyliurea. Munuaisten ja maksan toiminnan heikentyessä haittojen riski kasvaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset. Lääkkeeseen liittyy pitkittyneen hypoglykemian vaara.