

Kuva 1. Vastaukset kysymykseen: "Voitaisiinko seuraavia PD-(L)1-estäjällä toteutettuun lääkehoitoon liittyviä potilaskohtaisia tietoja kerätä luotettavasti sairaalanne tietojärjestelmistä?" *Arvioituna validoidulla mittarilla. **Esimerkiksi "metastoitunut ei-levyepiteeliperäinen ei-pienisolainen keuhkosityöpä" tai "relapsoitunut tai refraktorinen klassinen Hodgkinin lymfooma".

Voitaisiinko seuraavia PD-(L)1-estäjällä toteutettuun lääkehoitoon liittyviä potilaskohtaisia tietoja kerätä luotettavasti sairaalanne tietojärjestelmistä?

	Kyllä, kaikilta potilailta %	Kyllä, joiltakin potilailta %	Ei %
Potilaan raportoimat lopputulokset* (esim. 15D, EQ-5D)	0 %	33 %	67 %
Syövän levinneisyys/vaikeusaste* (esim. TNM)	17 %	50 %	33 %
Tarkempi käyttöaihe**	33 %	33 %	33 %
Arvio mahdollisen haittatapahtuman vakavuudesta	33 %	33 %	33 %
Tieto hoitovasteen saavuttamisesta* (esim. RECIST)	33 %	50 %	17 %
Potilaan toimintakyky* (esim. ECOG, WHO, KPS)	50 %	33 %	17 %
Monesko hoitolinja on kyseessä?	67 %	17 %	17 %
Onko tauti edennyt lääkehoidon aikana?	67 %	17 %	17 %
Hoidon mahdollinen lopetus/tauotus haitan vuoksi	67 %	17 %	17 %
Mahdollisesti ilmenneet haittatapahtumat	67 %	33 %	0 %
Lääkkeen käyttöaihe syöpätyypin (ICD-10) mukaan	83 %	0 %	17 %
Tieto monoterapiasta tai yhdistelmähoidosta	83 %	0 %	17 %
Lääkehoidon mahdollinen lopetuspäivämäärä	83 %	17 %	0 %
Lääkehoidon aloituspäivämäärä	100 %	0 %	0 %
Lääkkeen annostus ja annostelutiheys	100 %	0 %	0 %
Potilaalle annettujen lääkeannosten määrä	100 %	0 %	0 %

*Arvioituna validoidulla mittarilla

**esim. "metastoitunut ei-levyepiteeliperäinen ei -pienisoluinen keuhkosityöpä" tai "relapsoitunut tai refraktorinen klassinen Hodgkinin lymfooma"